

Den norske tannlegeforening
Postboks 2073 Vika
0125 OSLO

Deres ref.:
Vår ref.: 21/48493-3
Dato: 25.02.2022

Dette er en kopi. Originalbrevet er sendt til mottakerne i listen nederst.

Avvikling av Covid-19-retningslinje for jevnlig testing og bruk av munnbind av ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinert

Retningslinjen for jevnlig testing og bruk av munnbind for ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinert avvikles fra og med 25. februar 2022.

Det betyr at:

- Det er nå like regler for alle ansatte i helse- og omsorgssektoren. Det er ikke lenger særskilte regler for ansatte som ikke er fullvaksinert.
- Dette er hovedregelen. Det kan være aktuelt med egne lokale regler, avhengig av risiko for alvorlig sykdomsforløp hos pasienter og lokale forhold.
- Alle ansatte i helse- og omsorgsinstitusjoner bør følge:
 - Grunnleggende smittevernrutiner
 - Lokale infeksjonskontrollprogrammer
 - FHIs råd og anbefalinger for [SARS-CoV-2-testing av ansatte i helse- og omsorgstjenestene](#)¹
 - FHIs [råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr](#)²

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at helsetjenesten opprettholder forsterkede smitteverntiltak som beskrevet på FHI sine hjemmesider.

Ansatte som jobber med pasienter og beboere med særlig høy risiko

Spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner bør vurdere om det er behov for å sette inn tiltak rettet mot ansatte som jobber med pasienter som har særlig høy risiko for alvorlig forløp ved SARS-CoV-2 sykdom.

Før arbeidsgiver eventuelt setter inn tiltak, skal det være gjort en lokal risikovurdering. Jevnlig testing i en begrenset tidsperiode er blant de tiltakene som kan være aktuelle.

Bakgrunn og begrunnelse

Retningslinjen for jevnlig testing og bruk av munnbind ble innført i november 2021 og gikk ut på at ansatte som ikke var fullvaksinerte eller hadde gjennomgått covid-19 ble testet to ganger i

¹ [Testing for SARS-CoV-2 av ansatte og pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenester - FHI](#)

² [Bruk av personlig beskyttelsesutstyr - FHI](#)

uken og ble anbefalt å bruke munnbind ved pasientkontakt. Hensikten var å redusere risikoen for at ansatte i helse- og omsorgstjenesten, som ikke var fullvaksinert og som var smittet med SARS-CoV-2, skulle smitte pasienter, beboere, brukere eller andre ansatte.

De fleste ansatte i helse- og omsorgstjenesten er grunnvaksinert og har fått oppfriskningsdose. Deres beskyttelse mot å bli smittet med SARS-CoV-2 kan se ut til å være av begrenset varighet, og både vaksinerte og uvaksinerte kan dermed potensielt være smitteførende. For å forebygge/begrense smitte inn i helse- og omsorgstjenesten bør samme tiltak gjelde for alle ansatte uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi:

DEN NORSKE LEGEFORENING

Den norske tannlegeforening

FAGFORBUNDET

FOLKEHELSEINSTITUTTET

Utbrudd Utbrudd

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET (2)

Krisestab HOD

HOVEDORGANISASJONEN VIRKE

KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON

Landets statsforvaltere

Norsk Sykepleierforbund

NORSK TANNPLEIERFORENING